

**Tabelle 1 | Impfkalender 2025 (Standardimmunisierungen mit Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern [mAk]); für Indikationsimpfungen wird auf Tabelle 2 verwiesen****A – Säuglinge, und Kleinkinder bis zum Alter von 59 Monaten (≤ 4 Jahre)**

| Impfung/Immunsierung                          | Alter in Wochen                                     |    |                 | Alter in Monaten |      |    |     |      |                 |                 |                 |    |       |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------|------------------|------|----|-----|------|-----------------|-----------------|-----------------|----|-------|--------|
|                                               | 0                                                   | 4  | 6               | 2                | 3    | 4  | 5–7 | 8–10 | 11 <sup>*</sup> | 12              | 13–14           | 15 | 16–23 | 24–59  |
|                                               | U2                                                  | U3 |                 | U4               |      |    | U5  |      | U6              |                 |                 |    | U7    | U7a/U8 |
| Respiratorische Synzital Viren                | mAk (Einmaldosis) je nach Geburtsmonat <sup>a</sup> |    |                 |                  |      |    |     |      |                 |                 |                 |    |       |        |
| Rotaviren                                     |                                                     |    | G1 <sup>b</sup> | G2               | (G3) |    |     |      |                 |                 |                 |    |       |        |
| Tetanus <sup>c</sup>                          |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Diphtherie <sup>c</sup>                       |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Pertussis <sup>c</sup>                        |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Hib <sup>c</sup> – <i>H. influenzae</i> Typ b |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Poliomyelitis <sup>c</sup>                    |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Hepatitis B <sup>c</sup>                      |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Pneumokokken <sup>c,d</sup>                   |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 | G3 <sup>f</sup> |                 |    |       |        |
| Meningokokken B <sup>e</sup>                  |                                                     |    |                 | G1               |      | G2 |     |      |                 |                 | G3 <sup>f</sup> |    |       |        |
| Meningokokken C                               |                                                     |    |                 |                  |      |    |     |      |                 | G1              |                 |    |       |        |
| Masern, Mumps, Röteln                         |                                                     |    |                 |                  |      |    |     |      | G1              |                 |                 | G2 |       |        |
| Varizellen                                    |                                                     |    |                 |                  |      |    |     |      | G1              |                 |                 | G2 |       |        |

**B – Kinder ≥ 5 Jahre, Jugendliche und Erwachsene**

| Impfung                        | Alter in Jahren |     |                 |                 |    |                 |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|----|-----------------|---------------------------|-----------------|
|                                | 5–6             | 7–8 | 9–14            | 15–16           | 17 | ab 18           | 60–74                     | ab 75           |
|                                | U9              | U10 | U11/J1          |                 | J2 |                 |                           |                 |
| Tetanus                        | A1              |     | A2              |                 |    | A <sup>h</sup>  |                           |                 |
| Diphtherie                     | A1              |     | A2              |                 |    | A <sup>h</sup>  |                           |                 |
| Pertussis                      | A1              |     | A2              |                 |    | A3 <sup>h</sup> |                           |                 |
| Poliomyelitis                  |                 |     | A1              |                 |    |                 |                           |                 |
| Hepatitis B                    |                 |     |                 |                 |    |                 |                           |                 |
| HPV – Humane Papillomviren     |                 |     | G1 <sup>k</sup> | G2 <sup>k</sup> |    |                 |                           |                 |
| Meningokokken C                |                 |     |                 |                 |    |                 |                           |                 |
| Masern                         |                 |     |                 |                 |    | S <sup>i</sup>  |                           |                 |
| Mumps, Röteln                  |                 |     |                 |                 |    |                 |                           |                 |
| Varizellen                     |                 |     |                 |                 |    |                 |                           |                 |
| Pneumokokken                   |                 |     |                 |                 |    |                 | S <sup>k</sup>            |                 |
| Herpes zoster                  |                 |     |                 |                 |    |                 | G1 <sup>l</sup>           | G2 <sup>l</sup> |
| Influenza                      |                 |     |                 |                 |    |                 | S (jährlich) <sup>m</sup> |                 |
| COVID-19                       |                 |     |                 |                 |    | Gx <sup>n</sup> | S (jährlich) <sup>m</sup> |                 |
| Respiratorische Synzital Viren |                 |     |                 |                 |    |                 |                           | S <sup>n</sup>  |

Empfohlener Impfzeitpunkt

Empfohlener Zeitraum für die Verabreichung der mAk

Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung und Verabreichung der mAk

**a** Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3.–10. Lebenstag).

**b** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

**c** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen

**d** Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft

**e** Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen

**f** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate

**g** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich

**h** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

**i** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

**j** Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate

**k** Impfung mit PCV20

**l** 2 Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

**m** Jährliche Impfung im Herbst

**n** 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison

\* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden

G Grundimmunisierung (G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

mAk monoklonale Antikörper